

Dentisterie équine

Soins dentaires spécialisés



Tous les chevaux doivent recevoir des soins dentaires au moins une fois par an afin de prévenir la formation de surdents qui peuvent blesser les tissus mous de la bouche.

Votre vétérinaire pourra, par un examen oral approfondi, identifier précocement des problèmes dentaires avant qu'ils ne nécessitent des soins plus importants.

IMPACTION DES MOLAIRES



**RADIOGRAPHIE D'UN
Kyste d'éruption
SUR LA MÂCHOIRE
INFÉRIEURE**

Elle est causée par une pression excessive entre les molaires opposées et affecte plus fréquemment les deuxièmes et troisièmes prémolaires.

Dans les cas classiques un kyste d'éruption, repéré comme une « bosse » non douloureuse sur la mâchoire supérieure ou inférieure des chevaux âgés de trois à quatre ans, se résorbera généralement avec le temps.

Dans les cas sévères, un gonflement important, chaud et douloureux de la mâchoire peut se développer suite à un abcès des racines dentaires.

ABCÈS DES RACINES DENTAIRES

Il touche plus couramment les jeunes chevaux (quatre à sept ans). Beaucoup de causes sont possibles dont le trauma, la fracture ou l'infection dans ou autour de la dent.

Un gonflement et une fistule peuvent apparaître si une molaire inférieure est touchée. Un abcès dentaire affectant une molaire supérieure entraînera pour sa part un gonflement et/ou un jetage nasal malodorant provenant d'un seul naseau.

Le diagnostic requiert une sédation et un examen radiographique pour identifier la dent atteinte. Parfois dans des stades précoces, les modifications radiologiques sont discrètes et des méthodes diagnostiques supplémentaires

peuvent être nécessaires.

Le traitement repose sur une antibiothérapie longue et, si c'est opportun, un travail sur les dents afin de supprimer un problème sous-jacent. Dans le cas où le sinus est infecté, un lavage est effectué grâce à un cathéter sinusal. Pour les cas qui ne répondent pas au traitement initial, il faut extraire la dent.

**JETAGE
PERSISTANT ET
MALODORANT
PROVENANT
D'UN NASEAU
LORS D'UN
ABCÈS
DENTAIRE
SUPÉRIEUR**



FRACTURES DE DENT



**FRACTURES DES PREMIÈRE
ET DEUXIÈME PRÉMOLAIRES
SUPÉRIEURES**

Elles sont causées par un traumatisme, un déplacement ou une carie. Le diagnostic nécessite une sédation, un examen minutieux et parfois des radiographies.

Une dent sévèrement fracturée peut nécessiter une extraction. Les cas moins sévères peuvent être traités par extraction des fragments détachés, administration de sérum antitétanique et antibiotiques.

La dent opposée est meulée pour prévenir un excès de pression sur la dent fracturée. Si nécessaire la dent endommagée peut être stabilisée par un cerclage.

Dans un premier temps, une ration de concentrés mouillés peut être nécessaire pour permettre à la dent d'être moins sollicitée et de guérir.

DIASTEME ET MALADIE PARODONTALE

Un diastème est un espace entre les molaires dans lequel un bourrage alimentaire peut causer une infection douloureuse de la gencive : la maladie parodontale.

Plusieurs causes sont possibles dont l'encombrement, une mauvaise occlusion, des dents mal placées.

Les symptômes incluent la mauvaise haleine (halitose), le gaspillage alimentaire, la perte de poids et la formation de boulettes dans les joues. Les chevaux affectés sont plus enclins à des obstructions œsophagiennes et des coliques d'impaction à cause d'une mauvaise mastication des fibres.

Une maladie parodontale non traitée peut amener à des complications telles que des infections des racines dentaires mais aussi des os et des sinus qui les joutent.

Le diagnostic est posé grâce à un examen minutieux sous sédation profonde car ces zones sont très douloureuses. Il est nécessaire de dégager tous les débris alimentaires pour bien se rendre compte de l'étendue des lésions.

Le traitement consiste à nettoyer tous les débris alimentaires. Un gel antibiotique et du matériel d'empreinte dentaire peuvent être utilisés pour remplir les espaces et protéger les sites affectés de la nourriture et ainsi permettre à la gencive de guérir. Généralement cette procédure doit être répétée à de nombreuses reprises.

Les diastèmes peuvent nécessiter d'être élargis en utilisant une fraise mécanique afin de permettre à la nourriture de s'évacuer facilement de l'espace interdentaire. Cette procédure réclame une grande précision pour ne pas léser les parties vivantes de la dent et doit être réalisée par un chirurgien vétérinaire.

Occasionnellement le traitement requiert une extraction dentaire en cas de déplacement important ou d'encombrement dentaire.

Un régime alimentaire avec de l'herbe hachée menu et des concentrés à teneur élevée en fibres peut aider à réduire l'impaction alimentaire.



DIASTÈME REMPLI DE DÉBRIS ALIMENTAIRES

CARIES DENTAIRES

La carie est une infection de la dent, elle peut la fragiliser et conduire à une fracture ou une infection des racines.

Les caries peuvent être repérées par examen approfondi de la bouche.

Des obturations dentaires peuvent maintenant être réalisées afin de stopper la dégradation de la dent.

La dent cariée est fraisée, nettoyée et obturée grâce à du matériel spécifique.



OBTURATION D'UNE MOLAIRE SUPÉRIEURE



PEGAS est un nouveau concept où des vétérinaires équins indépendants localisés en France, se regroupent et s'engagent ensemble pour apporter aux chevaux les meilleurs soins possibles afin de satisfaire leurs clients.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans l'accord préalable de l'éditeur

Pour plus d'information contactez :