


Le bouchon œsophagien



Le bouchon œsophagien est une obstruction de l'œsophage relativement fréquente chez les chevaux et les poneys. Il est causé en majorité par une accumulation de nourriture dans l'œsophage ; dans des cas plus rares, un corps étranger (morceau de bois ou plastique) peut en être l'origine. Dans la majorité des cas, le bouchon œsophagien se résout rapidement et spontanément. Si le bouchon œsophagien perdure plus de 30 minutes, l'intervention du vétérinaire est nécessaire.

Il est important de bien différencier le bouchon œsophagien chez le cheval à l'étouffement chez l'homme du au blocage des conduits respiratoires. Malgré l'obstruction de l'œsophage, le cheval peut toujours respirer normalement.

Signes cliniques

- Tentatives de déglutition
- Extension de l'encolure
- Toux
- Nourriture et salive sortant des deux naseaux (jetage alimentaire)
- Salivation excessive
- Perte d'appétit soudain
- Dans certains cas, le bouchon peut être vu ou senti à la palpation du côté gauche de l'encolure

Si vous suspectez que votre cheval est entrain de faire un bouchon œsophagien, il est important que votre cheval ne mange pas. Cela peut empirer l'importance du bouchon ainsi que la difficulté à le faire passer.

Si le bouchon œsophagien ne se résout pas spontanément, vous devez appeler votre vétérinaire. Ce dernier pourra vous indiquer les gestes à effectuer ainsi que ceux à ne pas faire, en attendant son arrivée.

Les chevaux et les poneys ayant des problèmes dentaires pour mâcher leur nourriture ainsi que ceux qui mangent très rapidement sont prédisposés à faire des bouchons œsophagiens. La nourriture sèche est aussi un facteur à risque.



DES SOINS RÉGULIERS DENTAIRES PEUVENT RÉDUIRE LE RISQUE DE BOUCHON ŒSOPHAGIEN

POINTS CLES

- Ne paniquez pas ! Le bouchon œsophagien est rarement une urgence vitale. Dans de nombreux cas, la guérison est spontanée.
- Faites appel à un vétérinaire si le bouchon œsophagien dure plus de 30 minutes. En attendant son arrivée, vous devez retirer l'eau et la nourriture pour éviter que votre cheval continue à manger et que le bouchon œsophagien se complique.
- Après un bouchon œsophagien, il est important de surveiller la respiration de votre cheval (valeur normale de la fréquence respiratoire < 16 battements par minute), l'absence de toux et la température rectale pendant une semaine.
- Des soins dentaires réguliers permettent de prévenir les bouchons œsophagiens.

Diagnostic

Le diagnostic est basé principalement sur les signes cliniques et peut être définitivement confirmé par le passage d'une sonde nasogastrique, c'est-à-dire une sonde qui entre par un naseau et qui arrive dans l'estomac en passant par l'œsophage. Le blocage de la sonde dans l'œsophage indique un bouchon œsophagien.

Du fait de la sensibilité de la muqueuse des cavités nasales, il est assez fréquent qu'un saignement de nez apparaisse après passage de la sonde. Cela paraît spectaculaire, mais c'est rarement voir jamais une complication sérieuse.



LE PASSAGE D'UNE SONDE NASOGASTRIQUE PERMET D'ÉTABLIR LE DIAGNOSTIC ET AIDE À L'ÉLIMINATION DU BOUCHON ŒSOPHAGIEN

Traitement

- Après un examen clinique, le cheval présentant un bouchon œsophagien est souvent tranquilisé pour réduire son anxiété, relâcher l'œsophage et maintenir sa tête la plus basse possible ce qui diminue le risque pour le cheval d'inhaler salive et nourriture.
- La mise en place de la sonde nasogastrique permet d'envoyer prudemment de l'eau pour ramollir le bouchon œsophagien et permettre de s'évacuer par la sonde.
- La majorité des cas de bouchons œsophagiens sur le terrain se résout bien après l'intervention du vétérinaire. Cependant, certains cas de bouchons œsophagiens peuvent être sérieux et requièrent l'hospitalisation du cheval dans une clinique spécialisée.
- La principale complication après l'épisode d'un bouchon œsophagien est la pneumonie par aspiration causée par l'inhalation de nourriture et de salive. La prescription d'antibiotiques à large spectre peut prévenir les risques.
- Les bouchons œsophagiens importants ou non traités à temps peuvent causer de sérieuses cicatrices de l'œsophage, ce qui réduit son diamètre et augmente les chances de refaire un bouchon œsophagien. Des anti-inflammatoires peuvent être prescrits pour réduire au maximum les risques de lésions de l'œsophage.

Prévention

- S'assurer que la pulpe de betterave est bien trempée et gonflée ainsi que les granulés bien humidifiés.
- Toujours s'assurer que le cheval ait mangé du foin au boxe avant de donner les granulés, surtout si le cheval était en pâture avant.
- Ajouter un objet tel que balle ou grosse pierre dans la nourriture pour ralentir le repas et aider le cheval à mâcher et à saliver plus longuement.
- Faire contrôler la dentition de son cheval par son vétérinaire tous les six à douze mois.
- Après un bouchon œsophagien, réalimenter progressivement son cheval en commençant par des soupes de grains ou mash puis du foin trempé pendant plusieurs jours pour que la cicatrisation de l'œsophage se fasse au mieux.

Pour plus d'information contactez :



PEGAS est un nouveau concept où des vétérinaires équins indépendants localisés en France, se regroupent et s'engagent ensemble pour apporter aux chevaux les meilleurs soins possibles afin de satisfaire leurs clients.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans l'accord préalable de l'éditeur