

Les coliques

« Colique » signifie simplement « douleur abdominale » et a donc beaucoup de causes différentes possibles.

Cela peut être sérieux et même mettre la vie de l'animal en danger, mais la plupart des chevaux avec des coliques récupèrent totalement et sans séquelles.

On distingue les **causes d'origines digestives et extradiigestives** (ovaires, ...).



- Le tractus gastro-intestinal du cheval fait 25 à 30 m de long et est composé de l'estomac de l'intestin grêle, du *caecum* et du gros intestin.
- En fonction des zones affectées, les signes cliniques sont souvent différents dans leur présentation et leur sévérité.
- La plupart des cas répondent bien au traitement médical comme les analgésiques, les antispasmodiques et les perfusions. Mais parfois, la chirurgie est nécessaire pour corriger le problème. Dans une minorité de cas, l'euthanasie sera la seule solution éthique.
- Pour rassembler le maximum d'informations, votre vétérinaire peut avoir besoin de réaliser : **une palpation transrectale, un sondage naso-gastrique, un prélèvement de sang ou de liquide abdominal, ou encore une échographie.**
- N'oubliez pas que, même si votre cheval est calme et habituellement bien élevé, un cheval douloureux peut se rouler ou taper sans prévenir. Il faut donc faire attention à sa propre sécurité quand on le manipule.

Les signes de coliques

- Décubitus
- Grincement de dents
- Gratte le sol
- Sudation
- Se roule
- Abattement
- Se donne des coups de pieds dans le ventre
- Etirements
- Se regarde le ventre
- Se place en position pour uriner
- Appétit diminué ; anorexie



TYPES DE COLIQUES

- **Spasmodiques** dues à un changement d'alimentation ou de gestion, du parasitisme, un stress, la chaleur, un abreusement avec de l'eau trop froide, etc...
- **Impaction** (similaire à la constipation) peut être due à une alimentation sèche, des problèmes dentaires, une défaillance d'apport en eau, un manque d'activité, une consommation excessive de paille, etc...
- **Déplacement / torsion d'intestin** : une chirurgie sous anesthésie générale peut être nécessaire.
- **Autres causes** : tumeurs, infections, maladies hépatiques, maladies de l'herbe, ulcères.

PARAMÈTRES CLINIQUES NORMAUX DU CHEVAL

- **Fréquence cardiaque** : 25 à 45 battements par minute (dépendant de la taille, de la race et de la forme physique).
- **Fréquence respiratoire** : 8 à 12 respirations par minute.
- **Température** : 37.5°C à 38.5°C.
- **Bruits digestifs** : doivent être présents au niveau de tout l'abdomen.
- **Muqueuses** : doivent être roses pâles et humides.



Avant que le vétérinaire arrive

- enlever la nourriture et rationner l'eau si l'abreuvement est important ;
- marcher le cheval en main ;
- si possible avoir un box prêt avec une litière propre et une luminosité satisfaisante ;
- éventuellement préparer de l'eau tiède ;
- ne pas donner d'analgésiques ou autre médicament sans le consentement du vétérinaire.

Prévention des coliques

- garder une gestion et une alimentation les plus régulières possibles ;
- contrôler de façon raisonnée le parasitisme ;
- pour les chevaux qui tiquent à l'air, avoir une gestion de leur environnement appropriée (mise au pré, absence de zone d'appui dans le box...) ;
- fournir un régime alimentaire abondant en fibres (foin, enrubanné, ou herbe).

Pour plus d'information contactez :



PEGAS est un nouveau concept où des vétérinaires équins indépendants localisés en France, se regroupent et s'engagent ensemble pour apporter aux chevaux les meilleurs soins possibles afin de satisfaire leurs clients.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans l'accord préalable de l'éditeur