


# Les ulcères gastriques



**EGUS (Equine gastric ulcer syndrome) ou syndrome des ulcères gastriques équins est un phénomène d'érosion de la muqueuse de l'estomac** du cheval due à une exposition prolongée ou excessive d'acidité produite par l'estomac. Les ulcères gastriques peuvent toucher tous les équidés : le cheval de course, le cheval de sport de haut niveau ainsi que le cheval ou le poney de loisir.

## CAUSES D'ULCÈRES GASTRIQUES

### Alimentation

Les cellules de l'estomac du cheval sécrètent continuellement de l'acide. A l'état sauvage, les chevaux broutent constamment, ce qui permet de tamponner l'acidité grâce à l'herbe et la salive produite. Avec la sédentarisation et le nouveau mode de vie, les chevaux et les poneys ne mangent pas pendant des périodes assez longues, mais la production d'acide par l'estomac ne s'arrête pas ce qui cause des ulcères gastriques. Une alimentation riche en concentrés qui augmente l'acidité est aussi un facteur de risques.

### Exercice

Pendant l'exercice, l'acide qui est produit dans la partie basse de l'estomac (partie glandulaire) peut être projeté dans la partie haute non protégée de l'estomac (partie non glandulaire).




### Stress

Toutes conditions de stress (course, épreuve sportive, transport, changement d'écurie, hospitalisation, brusque, changement d'alimentation) augmentent le risque d'ulcères gastriques. Les chevaux malades et/ou sous médication ainsi que les poulains sont aussi potentiellement des sujets à risques.

## Signes cliniques d'ulcères gastriques

Nombreux sont les signes cliniques reliés aux ulcères gastriques mais ils sont très différents selon les chevaux :

- Perte d'appétit
- Perte d'état
- Poils pouvant être piqués
- Coliques d'une intensité souvent modérée
- Changement de comportement, Tic à l'appui ou Tic de l'ours
- Contre performance incluant une baisse de forme



PHOTOGRAPHIES D'ULCÈRES GASTRIQUES RÉALISÉES AVEC UN GASTROSCOPE

## ÉLÉMENTS CLÉS

- N'importe quel individu (cheval ou poney) peut être sujet aux ulcères gastriques
- Les signes incluent le changement de comportement, des coliques répétées, une perte d'état et/ou d'appétit ainsi qu'une intolérance à l'effort.

## Diagnostic

Le diagnostic des ulcères gastriques requière l'utilisation d'un tube long environ de 3 mètres muni d'un faisceau lumineux et d'une caméra, appelé gastroscopie, permettant l'exploration de l'estomac. La gastroscopie est un outil diagnostique simple, réalisée sous sédation et relativement rapide. Le gastroscopie est passé dans le naseau du cheval et conduit jusqu'à l'intérieur de l'estomac. Le vétérinaire peut ainsi observer la muqueuse gastrique de l'estomac et la présence ou non d'ulcères gastriques. Le cheval doit être mis à jeun 16 heures environ avant la gastroscopie et l'eau retirée 2 heures avant car l'estomac du cheval a besoin d'être vide.



## Traitement

Lorsque la présence d'ulcères gastriques est confirmée, le but du traitement est de réduire l'acidité gastrique et diminuer les facteurs de risque. A l'heure actuelle, l'oméprazole est le seul médicament antiacide autorisé en France contre les ulcères gastriques. Il est très efficace en tant que traitement mais aussi en tant que moyen préventif utilisé à plus petites doses. L'utilisation d'oméprazole est autorisée en concours FEI mais pour les autres types de compétitions, il y a un délai dopage de 5 jours (ce délai est à vérifier en fonction de l'évolution des analyses et de la réglementation).

Il existe plusieurs préparations à base d'oméprazole, sur le marché internet en particulier, mais un seul a montré son efficacité protectrice de la muqueuse gastrique sur près de 24H (Article du Dr Merrit). Les autres produits n'ont souvent qu'une action de quelques heures. Parlez en avec votre vétérinaire.

Les ulcères se trouvant dans la partie glandulaire de l'estomac peuvent être traités en parallèle avec du Sucralfate qui procure une couche protectrice en adhérant à la muqueuse gastrique et en facilitant la cicatrisation. Certaines ulcérations dues à une infection bactérienne nécessitent l'administration d'antibiotiques.

**LES ULCÈRES GASTRIQUES PEUVENT ÊTRE À L'ORIGINE DE SIGNES CLINIQUES TRÈS VARIABLES COMME UN COMPORTEMENT CHANGEANT, UNE CONTRE PERFORMANCE AINSI QUE DES COLIQUES MODÉRÉES RÉPÉTITIVES OU UNE PERTE D'ÉTAT. LA GASTROSCOPIE RESTE UN MOYEN DIAGNOSTIC ESSENTIEL POUR INVESTIGUER LE MANQUE D'ÉTAT D'UN CHEVAL, UNE BAISSSE DE FORME ET DES COLIQUES RÉCURRENTES SANS EXPLICATIONS.**

## Prévention

- Les fourrages sont essentiels dans l'alimentation du cheval
- Un accès continu à un pâturage de bonne qualité ou du foin à volonté pour un cheval au box aide à la prévention d'ulcères gastriques.
- L'augmentation des fibres et la réduction des glucides (diminuer au maximum les rations d'aliments concentrés et éviter les aliments mélassés) dans l'alimentation du cheval aident à prévenir l'apparition des ulcères gastriques.
- Certains antiacides peuvent aider à diminuer les signes cliniques et à limiter l'occurrence des ulcères gastriques mais présentent un effet de courte durée.
- Une petite quantité de fibres, comme une poignée de luzerne, donnée avant l'effort, peut aider à stimuler la production de salive donc à tamponner l'acidité de l'estomac et donc à protéger la muqueuse gastrique.
- L'ajout d'huile végétale dans les rations (jusqu'à 200ml deux fois par jour) peut être bénéfique pour la protection contre les ulcères glandulaires. Il est important d'introduire l'huile dans la ration du cheval progressivement pour éviter tout signe de diarrhée et limiter l'apport important de calories.
- Une faible dose d'oméprazole peut prévenir l'apparition de nouveaux signes d'ulcération gastrique.



**PEGAS** est un nouveau concept où des vétérinaires équins indépendants localisés en France, se regroupent et s'engagent ensemble pour apporter aux chevaux les meilleurs soins possibles afin de satisfaire leurs clients.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans l'accord préalable de l'éditeur

Pour plus d'information contactez :